

Σχήμα παρακολούθησης της ηπατικής λειτουργίας με Valdoxan

Valdoxan 25 mg

- Πριν από την έναρξη των 25mg
ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 3 ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 6 ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 12 ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 24 ALTU/L
ASTU/L

Να πραγματοποιείτε εξέταση κάθε φορά που αιτιολογείται κλινικά.


Σε περίπτωση αύξησης της δόσης στα 50mg, ξαναρχίζετε το σχήμα παρακολούθησης.

- Έναρξη των 50mg ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 3 ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 6 ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 12 ALTU/L
ASTU/L
- Εβδομάδα 24 ALTU/L
ASTU/L

Να πραγματοποιείτε εξέταση κάθε φορά που αιτιολογείται κλινικά.

Όνομα ασθενή: _____

Ημερομηνία έναρξης: _____



* Όπως σκουρόχρωμα ούρα, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, κίτρινο δέρμα/μάτια, κοιλιακός πόνος πάνω δεξιά, επίμονη νεοεκδηλωθείσα και ανεξήγητη κόπωση.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και δεν αποτελεί προωθητικό υλικό. Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκδοση του εγγράφου είναι η πιο πρόσφατα αναθεωρημένη.