

Το daflon 500 mg στην πράξη

Micronisé κεκαθαρμένο φλαβονοειδές κλάσμα

Μην χρησιμοποιείτε Daflon 500 mg στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ποιοι είναι οι σημαντικοί εντοπισμένοι κίνδυνοι και οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εκδηλωθούν με Daflon 500 mg;

- Διαταραχές του νευρικού συστήματος:
 - Ζάλη, πονοκέφαλος, κακουχία: σπάνια ($\geq 1/10.000$ έως $< 1/1.000$)
- Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:
 - Διάρροια, δυσπεψία, ναυτία, έμετος: συχνά ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$)
 - Κολίτιδα: όχι συχνά ($\geq 1/1.000$ έως $< 1/100$)
 - Πόνος στην κοιλιακή χώρα: άγνωστης συχνότητας
- Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:
 - Εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση: σπάνια ($\geq 1/10.000$ έως $< 1/1.000$)
 - Μεμονωμένο οίδημα προσώπου, χειλιών, βλεφάρων: μη γνωστή συχνότητα. Κατ' εξαίρεση οίδημα Quincke.

Ποιες είναι οι προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που συνδέονται με τη χρήση του Daflon 500 mg;

- Η χορήγηση αυτού του προϊόντος για τη συμπτωματική θεραπεία της αιμορροϊδικής κρίσης, δεν υποκαθιστά τη θεραπεία άλλων πρωκτολογικών προβλημάτων.
- Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν αμέσως, πρέπει να πραγματοποιείται πρωκτολογική εξέταση και η αγωγή να επανεξετάζεται.

Για πλήρεις πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.